

**CONSENSO INFORMATO 07** rev.1 del 18.01.2022

**Test molecolare su tampone salivare per la ricerca  
dell'RNA SARS-CoV-2**

Io Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) Il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ Recapito telefonico \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_)

in Via/ Piazza \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Domiciliato a (se diverso da residenza) \_\_\_\_\_

Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

dopo aver preso visione dell'informativa allegata alla presente, **ACCONSENTO** volontariamente all'esecuzione dell'analisi per la ricerca dell'RNA SARS-CoV-2, mediante tampone salivare, dichiaro di essere consapevole dei limiti diagnostici legati alla tecnica e che il risultato del test sarà inserito automaticamente nel sistema informativo regionale di riferimento.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ **Firma dell'Interessato/a** \_\_\_\_\_

=====

**Se minorenne: nome e cognome del/i genitore/i o del tutore in stampatello e firma:**

\_\_\_\_\_

Firma di chi ha raccolto il consenso \_\_\_\_\_

## INFORMATIVA - CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

I test della saliva possono essere considerati un'opzione per il rilevamento dell'infezione da SARSCoV-2, qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei, ma vanno utilizzati preferibilmente entro i primi 5 giorni dall'inizio dei sintomi.

E' quanto indicato dalla circolare del Ministero della Salute sul loro utilizzo, che detta le indicazioni sulla raccolta dei campioni e sulla segnalazione dei casi.

Il test viene indicato come **utile per "screening ripetuti"** per motivi professionali o di altro tipo, sugli **anziani o disabili e sui bambini in ambito scolastico.**

L'esito del test molecolare su campione salivare sarà inserito automaticamente nel sistema informativo regionale di riferimento.

In riferimento a quanto disposto quindi dalla Circolare n. 021675 del 14/05/2021 del Ministero della Salute sull'uso della saliva per la diagnosi da infezione da SARS-CoV-2 La informiamo che:

- il test molecolare su campione nasofaringeo rappresenta il gold standard internazionale per la diagnosi di COVID-19 in termini di sensibilità e specificità.
- il campione di saliva può essere considerato un'opzione per il rilevamento dell'infezione da SARS-CoV-2 qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei:
- nei sintomatici il test deve essere eseguito entro i primi 5 giorni dall'inizio dei sintomi:
- negli asintomatici il test può essere considerato un'opzione, al tampone nasofaringeo, per chi è sottoposto ripetutamente a screening per motivi professionali o per aumentare l'accettabilità di test ripetuti: individui molto anziani e disabili, carenza di tamponi; test per i bambini: i test salivari possono rappresentare un utile strumento di monitoraggio dell'infezione SARS-CoV-2 nei bambini.

### ***Riassumendo: TEST SALIVARE PER I SINTOMATICI***

La saliva può essere utilizzata per i sintomatici come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei per l'identificazione di infezione da SARS-CoV-2 preferibilmente entro i primi 5 giorni dall'inizio dei sintomi.

### ***TEST SALIVARE PER GLI ASINTOMATICI***

Il campione di saliva può essere considerato un'opzione per il rilevamento dell'infezione da SARS-CoV-2 in individui asintomatici sottoposti a screening ripetuti per motivi professionali o di altro tipo, per aumentare l'accettabilità di test ripetuti, in particolare:

- se vengono sottoposti a screening individui molto anziani o disabili
- in caso di carenza di tamponi
- testing nei bambini di età non inferiore a 3 anni.